

DIABETES EN EL AULA



HIPOGLUCEMIA



¿CÓMO ACTUAR?

SÍNTOMAS



TEMBLORES



SUDORACIÓN



HAMBRE



CANSANCIO
DEBILIDAD



PALPITACIONES

SI ESTÁ CONSCIENTE...

1. PARAR LA ACTIVIDAD



2. MEDIR GLUCEMIA CAPILAR



3. INGERIR HC DE ABSORCIÓN



RÁPIDA (SEGÚN EDAD):

<4 AÑOS 2-3G HC

5-7 AÑOS 5-6G HC

8-10 AÑOS 10G HC

>11 AÑOS 15G HC

4. ESPERAR 15 MIN Y VOLVER A MEDIR

SI...

<70 MG/DL REPETIR PASO 3

>70 INGERIR HC DE ABSORCIÓN LENTA

(SEGÚN EDAD)




SI ESTÁ INCONSCIENTE...

LLAMAR AL 112 Y ADMINISTRAR GLUCAGÓN



HIPERGLUCEMIA



¿CÓMO ACTUAR?

SÍNTOMAS



SOMNOLENCIA



SED EXCESIVA



VISIÓN
BORROSA



ORINAR CON
FRECUENCIA

NIVELES DE GLUCOSA ENTRE 180-240:

1. PARAR LA ACTIVIDAD



2. MEDIR GLUCEMIA CAPILAR



3. ACTUAR:

BEBER MUCHA AGUA

ORINAR



ESPERAR A QUE LOS NIVELES SE

ESTABILICEN PARA COMER

SI LA GLUCEMIA ES



ACTIVIDAD FÍSICA



MIRAR SI HAY CUERPOS CETÓNICOS



CORREGUIR SEGÚN PAUTA



INTERPRETACIÓN

< 0,6 NORMAL O NEGATIVO

0,6 - 1,0 LIGERAMENTE ELEVADO

1,1 - 3,0 RIESGO CETOACIDOSIS

> 3,0 URGENCIAS

